

ENDEREÇO DOS CEREST :

TERESINA:

Av. Pernambuco, 2464 - B. Primavera
Fones: (86) 3221.1069 / 3217.3782
Cep: 64003-500

PARNAÍBA:

Rua Caiapós, S/N - B. Pindorama
Fone: (86) 3323.2175 - Cep: 64215-316

BOM JESUS:

Rua Euvécio Pinheiro, S/N
Fone (89) 3562.1196 - Cep: 64900-000

PICOS:

Rua São Vicente, 325 - B. São Vicente
Fone: (89) 3422.3210 - Cep: 64600-000

**CONTE PRA GENTE,
CONTE COM A GENTE**



CEREST

**CENTRO ESTADUAL DE
REFERÊNCIA EM SAÚDE
DO TRABALHADOR**



SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA
Ministério da Saúde



TRABALHADOR VACINADO



TRABALHADOR FORTALECIDO



CEREST
CENTRO ESTADUAL DE
REFERÊNCIA EM SAÚDE
DO TRABALHADOR

CONHECENDO UM POUCO SOBRE VACINA:

Quem precisa ser vacinado contra o tétano?

- **Todos.** A bactéria causadora do tétano, o *Clostridium tetani*, está presente no ambiente (solo, esterco, superfície de objetos) sob a forma de esporos (formas de resistência). Como não é possível eliminar os esporos da bactéria causadora do tétano do ambiente, para evitar a doença é essencial que todas as pessoas sejam adequadamente vacinadas.

Quem precisa ser vacinado contra o hepatite B?

- **Todos.** O vírus da hepatite B está presente no sangue, na saliva, no sêmen e nas secreções vaginais da pessoa infectada.
- A transmissão pode ocorrer da mãe para o feto na gravidez, durante e após o parto; por via horizontal, através de pequenos ferimentos na pele e nas mucosas; pelo uso de drogas injetáveis.
- As relações sexuais constituem outra via importante de transmissão da hepatite B, considerada uma doença sexualmente transmissível (DST), porque o vírus atinge concentrações altas nas secreções sexuais.

Quem precisa tomar a vacina contra febre amarela?

- No Brasil, os locais de risco são as regiões de matas e rios das seguintes regiões: todos os Estados da Região Norte e Centro-Oeste, bem como parte da Região Nordeste (Estado do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), Região Sudeste (Estado de Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e Região Sul (oeste dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

As pessoas que moram nestas regiões, ou aqueles que irão viajar para estes locais devem tomar a vacina, caso ainda não tenham feito ou o fizeram há mais de dez anos.

O que é vacina tríplice viral?

- A vacina tríplice viral é uma combinação de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Todos os três componentes desta vacina obrigatória são altamente imunogênicos e eficazes, dando imunidade duradoura por praticamente toda a vida. A proteção inicia-se cerca de duas semanas após a vacinação.

Calendário básico de vacinação

Vacina	Número de doses com intervalo mínimo
Hepatite B ⁽¹⁾	3 doses em não vacinados => a 2ª dose intervalo de 1 mês da 1ª dose e a 3ª dose 6 meses a contar da 1ª dose
dT (difteria e tétano, tipo adulto) em não vacinados ⁽²⁾	3 doses em não vacinados com intervalo de 2 em 2 meses (reforço a cada 10 anos)
Febre amarela ⁽³⁾	1 dose em não vacinados (reforço a cada 10 anos)
SRC (tríplice viral, MMR) (até 49 anos)	1 dose em não vacinados

- O Cartão de Vacinação é um documento de comprovação de imunidade. É responsabilidade das Unidades de Saúde emití-lo ou atualizá-lo por ocasião da administração de qualquer vacina. Deve ser guardado junto com documentos de identificação pessoal. É importante que seja apresentado nos atendimentos médicos de rotina e fundamental que esteja disponível nos casos de acidentes.