

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA DE 0 A 2 ANOS

RISCO HABITUAL

Risco inerente à própria condição do ciclo de vida

RISCO INTERMEDIÁRIO (dois ou mais fatores de risco)

Fatores relacionados às condições de saúde na primeira semana e no primeiro mês de vida	Fatores sociofamiliares
Recém-nascidos termo precoce com IG de 37 a 38 sem	Gravidez não aceita
Risco de Hiperbilirrubinemia indireta patológica	Mãe adolescente
Risco de desmame precoce	Mãe com baixa escolaridade (< 5 anos de estudo)
Risco de sepse neonatal	Pai com baixa escolaridade (< 5 anos de estudo)
Fatores relacionados à nutrição	Mãe com pré-natal não realizado ou incompleto (< 6 consultas, não realização de exames e tratamento indicados não realizados ou incompletos)
Desmame do aleitamento exclusivo antes de 6 meses de vida	Irmãos < 5 anos com internação de repetição ou óbito por causa evitáveis
Desmame do aleitamento antes de 24 meses de vida	Mãe ou pai com condições que comprometem o cuidado da criança
Distanciamento do canal de crescimento da criança, em fase inicial, com relação ao peso, comprimento/altura e perímetro craniano	
Fatores relacionados ao cuidado	Mãe ausente por doença, abandono ou óbito
Criança não vacinada ou com esquema vacinal atrasado	Indícios de violência física, sexual ou psicológico
Não comparecimento à agenda de acompanhamento	
Higiene oral e corporal inadequado	Negligência com relação às necessidades da criança
Mãe ou cuidador não habilitado	Fatores relacionados ao ambiente
Doenças Próprias do ciclo de vida	Exposição à fumaça ambiental do tabaco
Doenças transitórias, sem complicações	Condições de moradia desfavorável
Doenças bucais de menor complexidade: lesão de mancha branca, cárie dentária, doença periodontal	Vulnerabilidade socioeconômica
	Dificuldades de acesso aos serviços de saúde e sociais

RISCO ALTO (um ou mais fatores de risco)

Condições Perinatais	Fatores evolutivos
Baixo peso (2.500g)	Crescimento fora dos limites padronizados para a idade
Prematuridade (IG < 37 semanas ao nascer)	Desenvolvimento insatisfatório para a idade
PIG (CIUR)	Espectro de doenças do autismo
GIG	Sinais de violência física, sexual ou psicológica
Apgar <=6 no quinto minuto	Obesidade
Asfixia Perinatal	Infecções do trato respiratório inferior de repetição
Hiperbilirrubinemia indireta grave	Asma moderada ou grave
Hiperbilirrubinemia direta ++	Doença diarreica crônica ou de repetição
Infecções crônicas do grupo ZTORCHS, confirmadas ou em investigação	Alergia ou intolerância alimentar com repercussão clínica
Malformações congênitas graves	Infecção urinária
Cromossomopatias	Complicações de infecções do sistema nervoso central
Doenças metabólicas	Desordens endócrinas, metabólicas, sanguíneas e imunes
Complicações da prematuridade	Cardiomiopatia, miocardite e outras doenças cardiovasculares e circulatórias
Doença pulmonar crônica	HIV/AIDS confirmado ou em investigação
Retinopatia e cegueira	Leucemia e outras neoplasias
Surdez	Doenças diagnosticadas na triagem neonatal
Outras, Qual?	Outras doenças evolutivas graves
Fatores Maternos	Intercorrências repetidas com repercussão clínica
Mãe e/ou pai com dependência de álcool e outras drogas	1 ou mais internações no último ano
Depressão materna	Condições Especiais
	Peso ao nascer < 2000g ou IG < 34 semanas
Doenças maternas graves e/ou não controladas	Malformação congênitas graves, cromossomopatias e doenças metabólicas com repercussão clínica
	2 ou mais internações no último anos

Fonte: MG^[33] e CONASS.^[34]

* Fatores de risco para hiperbilirrubinemia indireta patológica: baixo peso ao nascer, prematuridade, hemólise, asfixia ao nascimento, infecções, história familiar de icterícia grave, perda de peso do recém-nascido >10% nos primeiros 5 dias de vida associada à dificuldade de sucção ao peito ou presença de outras alterações ao exame clínico; † fatores de risco para sepse neonatal: baixo peso ao nascer, prematuridade, rotura de bolsa antes do trabalho de parto, bolsa rota acima de 18 horas e sinais de corioamnionite, como febre materna, dor suprapúbica, líquido amniótico fétido e história de infecção de trato urinário não tratado no último mês de gestação; ‡ icterícia, fezes claras e urina escura.

IG: idade gestacional; PIG: pequeno para a idade gestacional; CIUR: crescimento intrauterino restrito; GIG: grande para a idade gestacional; ZTORCHS: vírus zika, toxoplasmose, outras doenças, rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis



MINISTÉRIO DA SAÚDE

